



MINI VADESATU



Grupo CTO
Enfermería América



ctoamericaenfermeria

FUROSEMIDA



NOMBRE COMERCIAL

SEGURIL.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Diurético de techo alto.

PRESENTACIÓN

Ampolla de 20mg/2ml o 250mg/25ml.

ESTABILIDAD

Diluido: 24h a temp ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

Sin diluir, admin. en 1 min.

SÍ

IV INTERMITENTE

Diluir en 50-250ml.

SÍ

PERF CONTINUA

Emplear bomba de infusión.

SÍ

IM

En última opción.

SÍ

SUBC.

NO

DILUCIONES

Se puede diluir en SF.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría C. Fotosensible.





HALOPERIDOL

NOMBRE COMERCIAL

HALOPERIDOL.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Antipsicótico y neuroléptico, del grupo de las butirofenonas.

PRESENTACIÓN

Ampolla de 5mg/1ml.

ESTABILIDAD

Usar inmediatamente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

Sin diluir, admin. en 1 min.

SI

IV INTERMITENTE

Diluir en 50-100ml y
admin. en 30 min.

SI

PERF CONTINUA

SI

IM

SI

SUBC.

NO

DILUCIONES

Se puede diluir en SG5%. No se recomienda diluir con SF.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría C. Fotosensible.

HEPARINA SÓDICA



NOMBRE COMERCIAL

HEPARINA SÓDICA.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Anticoagulante.

PRESENTACIÓN

Vial 5ml al 1% (1.000 UI/ml) o al 5% (5.000 UI/ml).

ESTABILIDAD

Diluido: 24h a temp ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

SÍ

IV INTERMITENTE

NO

PERF CONTINUA

SÍ

IM

NO

SUBC. NO

Emplear bomba de infusión.

DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría C. No administrar en Y con otros medicamentos. ANTÍDOTO: Sulfato de protamina (1mg neutraliza 100UI heparina). 1mg heparina = 100UI.





HIDROCORTISONA



NOMBRE COMERCIAL

ACTOCORTINA.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Glucocorticoide.

PRESENTACIÓN

Vial liofilizado de 100mg o 500mg + API.

ESTABILIDAD

Reconstituído: 24h en nevera.
Diluido: 24h a temp ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

Admin. en 3-5 min.

SÍ

IV INTERMITENTE

Diluir en 100ml y
admin. en 30 min.

SÍ

PERF CONTINUA

NO

IM

SÍ

SUBC.

SÍ

DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría C.



ONDASENTRON



NOMBRE COMERCIAL

ZOFRAN, YATROX.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Antiemético.

PRESENTACIÓN

Ampolla de 4mg/2ml o 8mg/4ml.

ESTABILIDAD

Diluido: 7 días a temperatura ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

SI

Sin diluir, admin. lentamente.

IV INTERMITENTE

SI

Diluir en 50-100ml y
admin. en 15 min.

PERF CONTINUA

SI

Diluir 24mg en 500ml y
admin. en 24h.

IM

SI

SUBC.

NO


DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría B.

VANCOMICINA



NOMBRE COMERCIAL

DIATRACIN.

GRUPO FARMACOLÓGICO

Antibiótico (glucopéptido).

PRESENTACIÓN

Vial liofilizado de 500mg + API.

ESTABILIDAD

Reconstituído: 4 días en nevera.
Diluido: 14 días a temp ambiente.

ADMINISTRACIÓN

IV DIRECTO

NO

IV INTERMITENTE

SÍ

Diluir en 100ml y
admin. en 60 min.

PERF CONTINUA

NO

IM

NO

SUBC.

NO

DILUCIONES

Se puede diluir en SF o SG5%.

OBSERVACIONES

Riesgo teratogénico en embarazo – Categoría C. Puede solicitarse muestra de sangre para control de niveles de fármaco. Si aparece hipotensión y eritema con la administración, bajar velocidad de infusión.



CATÉTERES INTRAVENOSOS

24G → Flujo max. 20 ml/min
Indicado para infusiones de corta duración.
Indicado en geriatría o pediatría.

22G → Flujo max. 35 ml/min
Indicado para transfusiones y sueroterapia continua

20G → Flujo max. 61 ml/min
Indicado para transfusiones y sueroterapia continua

18G → Flujo max. 95 ml/min
Indicado para transfusiones, sueroterapia
y Nutriciones Parenterales Periféricas

16G → Flujo max. 185 ml/min
Indicado para transfusiones, cirugías y situaciones de urgencia vital

14G → Flujo max. 330 ml/min
Indicado para transfusiones, cirugías y situaciones de urgencia vital

(el color de cada catéter indica el color habitualmente usado por la casa comercial)

